n.° 147.

Observation sur une Lesion à la tête, par Contrecoup, par M.r Dubosq, M.e en chirurgie à ~~Vire~~ Vire.

Le Nommé Trempu, Journalier, agé d'environ Vingt ans etant à boire Le Vingt huit Juin dernier avec ses Camarades, dans une ferme Voisine de la Ville, eut dispute avec d'autres particuliers. Le Combat s'engagea de part et d'autre, et fut très vif. il reçut un Coup violent sur la tête, dont il fut renversé par terre, Comme mort, ayant perdu absolument tout mouvement et sentiment. Je fus mandé à l'instant. Je n'apperçus qu'une plaie forte Legere à la partie moyenne de L'occipital.

L'état d'ivresse ou était le malade à l'instant du Combat, me fit rejetter sur L'effet du vin le profond assoupissement dans lequel Je le trouvais. Je remis en Conséquence au Lendemain à faire des recherches plus Considerables. J'ordonnai un Lavement ainsy que du Thé, Mais il ne put en boire, Je lui réitérai Cinq à six heures après un second Lavement, le premier n'ayant point operé. L'assoupissement a persisté toute la nuit, et la machoire superieure a été occupée de

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC45 n.° 68

mouvements Convulsifs. Le lendemain le malade a été saigné trois fois, deux du Bras, et une du pied, sans que cela ait procuré aucune diminution dans les accidens.

Je fis raser la tête pour voir si je ne découvrais point quelque lésion. Je n'en appercu aucune. Je dilatai la plaie, ce qui occasionna beaucoup de douleurs. l'os n'était point dénudé. Je fis une seconde saignée de pied. on appliqua une large emplâtre vesicatoire derriere la tête, et deux aux jambes; j'ordonnai des fomentations émollientes et des Cataplasmes de même nature à appliquer sur la tête. Le trois l'assoupissement parut moins considérable. on passa deux lavemens dans la journée. Le malade jusqu'à ce moment n'a pour ainsy dire point bû. il a beaucoup crié, lorsqu'on lui a relevé les vesicatoires qui avaient bien pris, et est retombé à l'instant dans le même état de stupeur. Le quatre, on apperçu un léger empatement sur la partie moyenne du pariétal droit. la moindre pression sur cette partie occasionnait une

douleur très vive. Je trouvai apropos de faire une incision cruciale sur cette même partie, mais je ne voulus point m'y déterminer, sans appeller plusieurs de mes Confreres en consultation, qui la trouverent tous très nécessaire. Je la fis à l'instant. Nous avons trouvé les deux dans l'étendue de plus d'un écu de six Livres. Nous avons trouvé de plus une fracture située transversallement d'environ la longueur de deux pouces et demi, et une autre un peu moins Considérable proche l'angle posterieur & superieur du même os. J'appliquai une Couronne de trepan à la partie declive de la premiere fracture, sous laquelle il y avait environ plein une Cuiller à Caffé de sang épanché. J'en appliquai une autre à L'endroit de la seconde fracture, [redacted] L'épanchement etait moins Considerable. Des L'après midy, la Connoissance est revenue, les accidens se sont diminués insensiblement, & la Guérison a été parfaite au bout de trois mois.

Cette observation ne présenterait rien d'extraordinaire, si les signes donnés

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

apeuprès Comme Caractheristiques pour
Connoitre le Lieu de depanchement, s'etaient
trouvés chez notre malade; mais il ne s'en
est trouvé aucune. il n'y a point eû de
paralisie du Côté opposé au depanchement,
point de Convulsions du Côté affecté. le
malade n'a jamais porté sa main, de préference
sur une partie de la tête que sur l'autre. il
se Couchait alternativement sur les deux Côtés.